

## Sommerschnitt bei Kernobst

Gartentipp August 2014

### Entfernen von Konkurrenztrieben bei Jungbäumen

Der Schnitt und die Erziehung von Apfel – und Birnbäumen ist nicht auf den Winter beschränkt. Im Sommer sind der Zeitraum um den längsten Tag des Jahres und

**ab Mitte August** geeignet, um spezielle Reaktionen der Bäume herauszufordern.



Konkurrenztrieb  
am Stamm

Foto:  
H. RANK, LfULG

In den ersten Jahren der Erziehung von Bäumen zu Spindelbäumen ist es unbedingt notwendig, die Stammverlängerung des Baumes zu unterstützen. Dazu sollten Konkurrenztriebe rechtzeitig entfernt werden.

Besser als Schneiden im Winter ist es, diese Konkurrenztriebe an der Spitze des jungen Baumes um den längsten Tag des Jahres (Sommeranfang) vorsichtig herauszureißen. Die entstandene Wunde schließt sich schnell und der Wuchs wird nicht behindert.

### Heruntersetzen von Kronen

Wurden im Winter Kronen heruntergesetzt, sind im Frühjahr an den starken Schnittstellen und am Baumstamm viele neue Triebe gebildet worden.

Sie werden oft als 'Wasserschosser' bezeichnet. Dabei sind sie in keinem Fall wertlos. Diese einjährigen Triebe stellen das zukünftige Fruchtholz dar. Im Einzelfall kann selbst ein starker Neutrieb aus dem Stamm in ein paar Jahren eine Lücke im Gerüst des Baumes ausfüllen. Deshalb sollten nur Triebe, die nicht benötigt werden, entfernt werden. Das betrifft vor allem Austriebe am Stamm oder steile, starke Neutriebe im Kopf des Baumes. In jedem Fall ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Korrektur des Wuchses. Bevor die Neutriebe verholzen (etwa ab Mitte Juli), können sie jetzt sehr zeitsparend und auch für den Baum schonend abgerissen werden.

Mit einem kräftigen Ruck nach unten werden die Triebe und gleichzeitig die schlafenden Augen an der Ansatzstelle herausgerissen. Die Wunde heilt schnell ab.



starker Austrieb am Kopf  
Foto: H. RANK, LfULG